

# ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению  
лекарственного препарата

**Сиалор®**

**Регистрационный номер:** ЛП-004958

**Торговое наименование:** Сиалор®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** серебра протеинат

**Лекарственная форма:** таблетки для приготовления раствора для местного применения

## Состав на одну таблетку

*Действующее вещество:*

Серебра протеинат..... – 200 мг

*Вспомогательное вещество:*

повидон К 30..... – 20 мг

**1 ампула растворителя содержит:** вода для инъекций.

## Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от темно-коричневого до черного цвета с неравномерной окраской поверхности, с фаской, допускается металлический блеск.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код АТХ:** R01AX10

## Фармакологические свойства

### Фармакодинамика

Препарат серебра (серебра протеинат содержит 7,5-8,5 % серебра). Оказывает вяжущее, антисептическое и противовоспалительное действие. Диссоциирует с образованием ионов серебра, которые связываются с ДНК бактерий и препятствуют их размножению на слизистых оболочках в условиях местного применения. Механизм действия серебра протеината основан на том, что ионы серебра осаждают белки и образуют защитную пленку на поврежденной слизистой оболочке, которая способствует уменьшению чувствительности нервных окончаний и сужению кровеносных сосудов (это приводит к уменьшению отека), что в свою очередь обуславливает торможение воспалительных реакций. Ионы серебра также подавляют размножение различных бактерий. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *V. cereus*, *C. albicans*,

*E. coli*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *A. niger*, *S. Abony* и другие.

### Фармакокинетика

При местном применении практически не абсорбируется.

### Показания к применению

Симптоматическая терапия острого назофарингита, синусита; острый ринит (насморк).

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период лактации, атрофический ринит, детский возраст до 3-х лет.

### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан во время беременности и кормящим матерям, при необходимости применения препарата грудное вскармливание следует прекратить.

### Способ применения и дозы

Местно, в виде 2 % раствора.

Приготовление раствора проводить непосредственно перед применением.

Готовый раствор хранить при комнатной температуре. Раствор использовать в течение 30 дней после приготовления.

Для приготовления 2 % раствора 1 таблетку препарата (200 мг) растворяют в 10 мл растворителя (вода для инъекций).

*Способ приготовления раствора препарата перед применением:*



Перед применением препарата рекомендуется промыть и очистить носовые ходы.

### Для формы выпуска, включающей крышку с пипеткой:

*Детям от 3 до 6 лет* – по 1-2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день.

*Взрослым и детям старше 6 лет* – по 2-3 капли в каждый носовой ход 3 раза в день.

Продолжительность курса лечения – 5-7 дней.

**Для формы выпуска, включающей насадку-распылитель:**

*Взрослым и детям старше 6 лет:*

По 1-2 орошения слизистой оболочки полости носа 3 раза в день в течение 5-7 дней.

*Если через 7 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.*

*Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

**Побочное действие**

Легкое раздражение слизистой оболочки, жжение, зуд, аллергические реакции (крапивница, атопический дерматит, отек Квинке, анафилактический шок).

*Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

**Передозировка**

При рекомендуемом способе применения передозировка маловероятна.

*Симптомы:* возможно усиление побочных эффектов. При случайном проглатывании большого количества препарата может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.

*Лечение:* при сильном раздражении, жжении, зуде слизистые оболочки промыть большим количеством воды в течение 15 минут.

Если симптомы сохраняются, обратиться к врачу.

Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

*Фармакодинамическое, фармакокинетическое взаимодействие:* не изучено.

*Фармацевтическое взаимодействие:* соли цинка, меди, свинца, серебра, ртути, железа, алюминия образуют с раствором препарата нерастворимые осадки; раствор препарата инактивируется солями алкалоидов и органическими основаниями (эпинефрин).

*Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.*

**Особые указания**

Возможно окрашивание отделяемого из носа в серый или синий цвет.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Не влияет.

**Форма выпуска**

Таблетки для приготовления раствора для местного применения, 200 мг.

Комплект:

1 таблетка в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

1 ампула полимерная с растворителем (вода для инъекций) по 10 мл.

1 флакон темного стекла с винтовой горловиной объемом 15 мл, укуренный крышкой с пипеткой (для взрослых и детей от 3 лет) или насадкой-распылителем (для взрослых и детей старше 6 лет) с инструкцией по применению в пачке из картона.

**Условия хранения**

В пачке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:**

*Владелец регистрационного удостоверения, производитель:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл.,

Сузунский район, р.п. Сузун, ул. К. Зяткова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.pfk-obnovlenie.ru](http://www.pfk-obnovlenie.ru)

*Адрес места производства:*

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [okk@pfk-obnovlenie.ru](mailto:okk@pfk-obnovlenie.ru)