ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
лекарственного препарата

Сиалор® аква

Регистрационный номер:
ЛП-001997

Торговое наименование:
Сиалор® аква

Группировочное наименование:
морская вода

Лекарственная форма:
капли назальные

Состав
Действующее вещество:
Морская вода.....– 5 мл
Вспомогательное вещество:
вода очищенная.....– до 100 мл
Раствор содержит:
натрий.....– не менее 2,5 мг/мл
магний.....– не менее 0,35 мг/мл
кальций.....– не менее 0,008 мг/мл
калий.....– не менее 0,10 мг/мл
гидрокарбонаты– не менее 0,03 мг/мл
хлориды.....– не менее 3,5 мг/мл
сульфаты.....– не менее 1,5 мг/мл

Описание
Прозрачный или слегка опалесцирующий бесцветный раствор.

Фармакотерапевтическая группа:
носа заболеваний средство лечения

Код АТХ: R01AX10

Фармакологическое действие
Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, а также разжижению слизи и нормализации ее продукции бокаловидными клетками слизистой оболочки. Микроэлементы, входящие в состав морской воды, оказывают противовоспалительное действие, стимулируют репаративные процессы, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки к внедрению болезнетворных бактерий и вирусов, способствует ее очищению.

Показания к применению
• Аденоиды, острый, аллергический, вазомоторный ринит, хронические заболевания полости носа, носоглотки, придаточных пазух носа, в т.ч. сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки полости носа.
• Профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период, при изменении климатических условий (помещения с кондиционированием воздуха и/или центральным отоплением), наличии загрязненного атмосферного воздуха (курильщики, водители транспортных средств, горячие и запыленные цеха).
• Промывание ран полости носа и придаточных пазух носа до и после оперативных вмешательств.
• Гигиенические процедуры полости носа (в т.ч. у грудных детей).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания по показаниям.

Способ применения и дозы
Препарат следует применять интраназально.
С лечебной целью (лечение заболеваний слизистой оболочки полости носа, околоносовых пазух, носоглотки):
• детям до 1 года (грудным детям) – по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день;
• детям с 1 года до 7 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день;
• детям с 7 до 16 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4-6 раз в день;
• взрослым – по 2-3 капли в каждый носовой ход 4-8 раз в день.
Курс лечения 2-4 недели, при необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.
С профилактической целью:
• детям до 1 года (грудным детям) – с помощью турунд, смоченных препаратом, 2 раза в день, или путем инстилляции 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в день;
• детям с 1 года до 7 лет – по 1-2 капли в каждый носовой ход

1-3 раза в день;
• детям с 7 до 16 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 2-4 раза в день;
• взрослым – по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-6 раз в день.
С гигиенической целью: для размягчения и удаления выделений из носа препарат закапывают многократно (удаляя избыток жидкости с помощью ваты или носового платка) в каждый носовой ход до полного размягчения и удаления выделений. Детям в возрасте до 2 лет промывание полости носа следует производить в положении лежа. Следует повернуть голову ребенка набок, промыть верхний носовой ход, затем повторить процедуру с другим носовым ходом. Посадить ребенка, вытереть выделения из носа. Детям старше 2 лет и взрослым следует наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.

Побочное действие
Чувство дискомфорта в носовой полости в начале применения; возможны аллергические реакции.

Передозировка
Случаи передозировки не отмечены.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Так как препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными препаратами, используемыми для лечения насморка.

Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Не описаны.

Форма выпуска
Капли назальные.
По 2 мл, 5 мл, 10 мл в тюбик-капельницы с клапаном или по 10 мл, 15 мл, 20 мл в тюбик-капельницы с винтовой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.
1, 10, 20 тюбик-капельниц с клапаном по 2 мл или 5, 10, 20 тюбик-капельниц с клапаном по 5 мл, 10 мл, или 1 тюбик-капельницу с винтовой горловиной по 10 мл, 15 мл, 20 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
После вскрытия использовать в течение 14 суток.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:
Владелец регистрационного удостоверения, производитель:
АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»
Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.
Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.
Интернет: www.pfk-obnovlenie.ru
Адрес места производства:
г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.
Организация, принимающая претензии от потребителей:
АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,
e-mail: okk@pfk-obnovlenie.ru

RENEWAL